

 SILVER PRINTS PVT. LTD. #93 & 94, T.S Apparel Park, Gundlupochampally, Medchal (Mandal), Hyderabad -500 014	Plates Details:	Plate:  BLACK	Date : 01.07.2020
	Client	UNIQUE	
	Job Name	200955_Bonagermin_Leaflet	
	Size	120x130mm	
Prepared by : Maheswari			

 Pant. 3005 C
 Pant. 2587 C
 Pant. 354 C
 Pant. 3252 C
 Pant. 389 C

Bonagermin®

Probiotics

"Lea todo el prospecto antes de empezar a usar este producto";

"Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe utilizar con cuidado este producto para obtener los mejores resultados.",

"Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico."

NOMBRE DEL PRODUCTO: BONAGERMIN®

Forma Farmacéutica: Suspensión oral

Composición cuantitativa:

Cada ampolla de 5 mL contiene:
Bacillus clausii (UBBC-07) 2000 millones ufc.
 Excipiente, agua purificada c.s.p 5 mL

Fabricado por: UNIQUE BIOTECH LIMITED,
 Plot No.2 Phase-II, Alexandrà Knowledge Park,
 Kolthur Village, Shameerpet Mandal, Ranga Reddy
 District - 500 078, Telangana State, India.

Nombre y dirección del Titular del Registro Sanitario:
 BONAPHARM ECUADOR CL, Guayaquil-Ecuador.

Nombre y dirección del Titular del producto:
 BONAPHARM S.A.C., Lima - Perú.

Indicaciones terapéuticas.

Prevención de la diarrea asociada a antibióticos, tratamiento de la diarrea aguda infecciosa, y en la restauración de la flora intestinal.
 Prevención de infección por *Clostridium difficile* y enterocolitis necrosante, para disminuir los eventos adversos de la terapia de erradicación del *Helicobacter pylori*.
 Alivio de los síntomas del síndrome de intestino irritable.

Contraindicaciones:

No se recomienda en personas con hipersensibilidad

Precauciones de uso y advertencias:

No utilizar durante el embarazo, o cuando se sospeche de su existencia, ni durante la lactancia.

Interacción:

No se conocen medicamentos o alimentos que modifiquen su efecto.

Vía de administración: Oral.

Posología, Modo de empleo y Duración del tratamiento:

Niños: 1-2 ampollas por día antes del almuerzo y la comida

Adulto: 2 a 3 ampollas al día

Modo de empleo:

Administrar a intervalos regulares, cada 8 - 12 horas, tomando el contenido de la ampolla como tal o diluyendo en agua u otra bebida (por ejemplo, leche, té o jugo de naranja).

Duración del tratamiento: No se recomienda que se utilice de forma continua por más de 7 días.

Síntomas en caso de sobredosis y acciones a seguir.

No se reportan. Se debe mantener una ingesta y manejo adecuado y dar seguimiento a cualquier síntoma.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura no mayor de 30°C.

Efectos adversos:

Se han reportado reacciones adversas de hipersensibilidad, erupción cutánea, angioderma y urticaria.

Si usted presenta algún tipo de reacción adversa durante o después de consumir este producto, informar inmediatamente a la ARCSA y al Titular del Registro Sanitario.

Forma de presentación:

Caja + 10 ampollas x 5 mL c/u + inserto.

Signos visibles de deterioro del envase:

No utilizar el producto si observa: Cambios de color. La presencia de cuerpos extraños o de partículas visibles en las ampollas se debe a agregados de esporas de *Bacillus clausii* y, por lo tanto, no indica que el producto haya sufrido algún cambio.

Actual Size: 120x130mm